



| UTILISATION  | SEMAINE DE CROISSANCE  |                            |    |    | SEMAINE DE FLORAISON       |    |    |    |    |                       |                   |
|--|--|----------------------------|----|----|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|-------------------|
|  | Propagateur  | 1.                         | 2. | 3. | 1.                         | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. – Dernière semaine | Nettoyage basique |
| Désinfection des mains   | Avant tout contact et lors du changement de pièce              |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |
| Purolyt pour désinfecter les surfaces et l'air (pulvérisation / atomisation)               | 4 x par semaine<br>20 ml/L                                     | 3 x par semaine<br>20 ml/L |    |    | 2 x par semaine<br>20 ml/L |    |    |    |    | 20 ml/L               |                   |
| Purolyt pour désinfecter les outils et les appareils (pulvérisation / immersion)           | Avant et après chaque application : 20 ml de Purolyt par litre |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |
| Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service < 23 °C (ajout direct) | Preventive: 2 x par semaine 5-10 ml per 10L                    |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       | 40 ml/10L         |
| Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service < 23 °C (ajout direct) | Preventive: 1 x par semaine 5-10 ml per 10L                    |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       | 40 ml/10L         |
| Purolyt pour désinfecter / recycler les substrats inertes (trempage)                       | Avant chaque période de croissance 10 ml/L                     |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |
| Retirer les matières végétales mortes  | Sans délai   |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |
| Passer l'aspirateur  | Hebdomadairement   |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |
| Nettoyer le filtre d'air entrant   | Mensuellement  |                            |    |    |                            |    |    |    |    |                       |                   |

Remarque : La pulvérisation ou la vaporisation doivent toujours avoir lieu à la fin de la phase d'éclairage, en présence d'une quantité minimale / réduite de lumière. Éviter l'exposition aux rayons solaires et à la lumière ultraviolette.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.